용법용량

1. 위궤양의 단기치료 : 통상 라푸티딘으로 1회 10 mg을 1일 2회 오전 및 취침전에 경구 투여한다. 최대 8주간 투여한 임상시험 결과 대부분 8주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다.

2. 십이지장궤양의 단기치료 : 통상 라푸티딘으로 1회 10 mg을 1일 2회 오전 및 취침전에 경구 투여한다. 최대 6주간 투여한 임상시험 결과 대부분 6주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다.

3. 급성위염 및 만성위염의 위점막 병변의 개선 : 통상 라푸티딘으로 1일 1회 10 mg을 취침전 경구 투여한다. 최대 2주간 투여한 임상시험 결과 대부분 2주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 달라질 수 있다.

4. Helicobacter pylori에 감염된 소화성 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법: 라푸티딘 20 mg, 클래리스로마이신 500 mg, 아목시실린 1000 mg을 1일 2회 7일간 또는 14일간 투여한다.

5. 마취전투약 : 통상 라푸티딘으로서 1회 10 mg을 2회(수술전날 취침전, 수술당일 마취투여 2시간전) 경구투여한다.

6. 역류성 식도염 치료 : 라푸티딘으로서 1회 10 mg을 2회 경구투여한다.