사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 15세 미만의 소아

2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람

3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 비염용 내복약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해 거담제, 멀미약, 알레르기 약 등), 위장진통 진경제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 사람

2) 임신부 또는 임신하고 있다고 생각되는 사람

3) 고령자

4) 약물 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람

5) 고열, 배뇨 곤란, 입 갈증 등의 증상이 있는 사람

6) 녹내장, 당뇨병, 갑상선 기능 장애, 심장 질환, 고혈압 등의 진단을 받은 사람

7) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

관계 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
소화기	구역질·구토, 식욕 부진
정신 신경계	현기증, 불면증, 신경 과민, 두통, 경련

비뇨기과	배뇨 곤란
기타	얼굴 홍조, 눈부심

드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있으므로 이러한 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것.

증상 명	증상
재생 분량성 빈혈	파란 멍, 코피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보임, 피로감, 동계, 호흡 곤란, 어지러워짐, 혈뇨 등이 나타난다.
무과립구증	갑작스런 고열, 오한, 인후통 등이 나타난다.

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 장기간 계속 복용하지 말 것.

5~6일 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단하고 의사, 약사에게 상담할 것.

3) 15세 이상 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.

4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.

5) 복용시에는 음주하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

4) 알루미늄 시트와 내용의 필름이 손상되지 않도록 보관 및 휴대에 유의할 것.

5) 알루미늄 시트 개봉 후 즉시 복용할 것.

6) 사용기간(박스 및 알루미늄 시트에 기재)이 지난 제품은 복용하지 말 것.